محاضرات الكيمياء العامة

للمرحلة الأولى علوم حياة

م.د فاطمة عباس خزعل

ونفاعالنها وخواصها المختلفة.

خواص المادة : يمكن تقسيم خواص المادة الى ثلاث اقسام رئيسية :-

١- الخواص الكيميائية

٢- الخواص الفيزيائية

٣- الخواص الميكانيكية

١- الخواص الكيميائية :- ومن اهم خواص المادة الكيميائية قابلية هذه المادة او المواد المختلفة للتفاعل الكيميائي وإنتاج مواد أخرى بصبغات مختلفة وذلك عند الظروف المناسبة مثل عملية احتراق الفحم وإنتاج الرماد وصدأ الحديد وتعفن الطعام واحتراق الوقود . ويعبر عن هذا التفاعل بالمعادلة الكيميائية والتي هي وصف موجز ودقيق لهذا التغير الكيميائي.

٢- الخواص الفيزيائية :- مثل اللون ، والرائحة ، ودرجة الغليان ،درجة الانجماد، الكثافة ،الصلادة ، الحجم ،الكتلة ،الحالة (الصلبة ،السائلة ،الغازية) وغيرها تعتبر خواص فيزيائية للمادة. كما يمكن تقسيمها الى :-

أ- الخواص الشاملة:- مثل درجة غليان المادة ، لونها ، كثافتها وهي الخواص التي لا تعتمد على كمية المادة.

ب- الخواص المحددة :- مثل الكتلة والحجم وهي التي تتغير بتغير كمية المادة وهناك طريقة أخرى لتقسيم الخواص الفيزيائية:-

أ- خواص نوعية :- وهي الخواص التي لا يمكن تحديد قيمة معينه للخاصية مثل الطعم والرائحة

ب- خواص كمية :- وهي الخواص التي يمكن تحديد كميتها مثل درجة الغليان والكتلة.

٣- الخواص الميكانيكية :- مثل السرعة ، القوة، الشغل..

اشكال المادة / تتواجد المادة في الطبيعية على ثلاث اشكال

١- العنصر :- وهو المادة التي لا يمكن تفكيكها الى مواد أخرى بالطرق الكيميائية

والفيزيائية وهذا يدل على ان العنصر هو وحدة بناء المادة بحيث يمكن ان توجد هذه الوحدة بشكل مستقل وحر او شكل غير مستقر أي مرتبط مع عنصر او مادة أخرى. وقد بلغ عدد العناصر المعروفة (106) عنصر. ومن الجدير بالذكر ان عدد لا بأس به من العناصر لم يتم اكتشافه طبيعياً بل تم ايجاده عملياً فقط .

٢- المركب :- يتكون المركب دائماً من اكثر من عنصر واحد باتحادها كيميائياً مع بعضها البعض بطريقة محددة بحيث يحتوي المركب على العنصر المكونة له بنسبة وزنية ثابتة . ويتم تكوين المركب اما بتفاعل العناصر مع بعضها البعض او بتفاعل المركبات مع بعضها البعض او بتفاعل المركبات مع العناصر .وللمركبات أهمية كبيرة تتجاوز أهمية العناصر وفي كل يوم يكتشف مركبات جديدة ، وعدد المركبات المعروفة كبير جداً" يتجاوز المليون مركب . وتختلف المركبات في صفاتها وتفاعلاتها كلياً" عن العناصر المكونة لها ، ويمكن فصل عناصر المركب بالوسائل الكيميائية فقط .

٣- الخليط :- عند خلط عنصرين او أكثر بأي نسبة وزنية فان الناتج يدعى مخلوط وليس مركب . او قد يتكون الخليط من مجموعة من المركبات . قد تكون المخاليط متجانسة مثل الماء والسكر المذاب به او قد تكون غير متجانسة مثل الزيت والماء وتمتاز المخاليط بانه يمكن فصل بعضها عن بعض بالطرق الفيزيائية وتحتفظ كل مادة من مكونات الخليط بخواصها الاصلية.

الجدول الدوري / هو جدول يتضمن جميع العناصر مرتبة حسب ازدياد عددها الذري وقد توصل اليه العالم مندليف عام 1896 حيث بين ان الخواص العامة للعناصر لها علاقة بترتيبها الالكتروني واوزنها الذرية . رتب مندليف العناصر الى مجاميع (زمر) groups بصورة عمودية وفيها تحتوي العناصر على نفس العدد من الالكترونات في غلافها الخارجي اما العناصر التي تترتب بشكل افقي والتي تمتلك فيها العناصر نفس عدد الكم الرئيسي (n) فتدعى دورات (periods).

ما المقصود بالعدد الذري والعدد الكتلي :-

العدد الذري (Atomic number) :- يرمز له ب (Z) ويمثل عدد البروتونات الموجودة في نواة ذرة كل عنصر ويساوي عدد الالكترونات في الذرة المتعادلة كهربائياً ..

العدد الكتلي (Mass number) :- ويرمز له ب (A) ويدعى أيضاً بالوزن الذري وهو يمثل مجموع عدد البروتونات والنيوترونات في نواة ذرة العنصر ويكتب في اعلى يسار رمز العنصر بحجم اصغر .

عندما تكتسب الذرة الكترون فأنها تتحول الى ايون سالب وتعمل شحنة مساوية لعدد الالكترونات المكتسبة اما اذا فقدت الكترون فأنها تتحول الى ايون موجب يحمل شحنة موجبة مساوية لعدد الالكترونات المفقودة مثل الالمنيوم. عندما يفقد ثلاث الكترونات يتحول الى AL^{+3} اما الكلور عندما يكتسب الكترون يتحول الى ايون سالب CL^{-1}

شحنة الايون = عدد البروتونات – عدد الالكترونات .

شحنة الايون

عدد الالكترونات

عدد البروتونات

الايون

+3	10	13	Al ⁺³
+2	10	12	Mg ⁺²
-2	18	16	S ⁻²
-1	18	17	Cl ⁻¹

النظائر (Isotopes) :- وهي ذرات لنفس العنصر الكيميائي لها نفس العدد الذري لكنها تختلف في الكتلة الذرية بسبب اختلاف عدد النيوترونات ولا تختلف الخواص الكيميائية للذرة ونظيرها، لان الخواص الكيميائية للذرة تعتمد على عدد البروتونات وبالتالي على عدد الالكترونات التي تدور في الغلاف النووي وتوزيعها مثال: الكربون له ثلاث نظائر.

التصنيف الدوري للعناصر (periodic classification of elements)

الجدول الدوري -: periodic table

رتب العالم الروسي مندليف والعالم الألماني ماير العناصر تصاعدياً بسبب ازدياد اوزانها الذرية الى دورات (افقياً) وزمر (عمودياً)

المجاميع -: groups تتميز بأحرف وأرقام لاتينية ويحتوي الجدول الدوري على سبع دورات وثمان مجاميع عمودية (زمر) تتشابه في الغلاف الثانوي الأخير.

تقسم العناصر الى الأصناف الآتية:**١- العناصر النموذجية Representative elements**

وتمتلك هذه العناصر اغلفة ثانوية غير مشبعة بالالكترونات من نوع (p,s) مثل الزمر (IIA) ، (IA) والتي يكون فيها الغلاف S غير ممتلئ بالالكترونات وتدعى عناصر المجموعة (IA) بعناصر الفلزات القلوية بينما تدعى (IIA) بعناصر الاتربة القلوية . اما عناصر الزمر (VIIA _ IIIA) التي تمتلك غلاف P غير مشبع فبعضها يتصرف من كفلزات وقسم منها كأشباه فلزات .

٢- الغازات النبيلة Noble gases :- تقع هذه العناصر في الزمرة الثامنة (VIIIA) وتدعى أحيانا" بالزمرة صفر وتمتاز هذه العناصر بكون جميع اغلفتها مشبعة بالالكترونات وتقع في اقصى يمين الجدول الدوري .

٣- العناصر الانتقالية Transition metals :- هذه العناصر تمثلها المجاميع (IB - VIIB) وتمتلك غلafa" ثانويا" خارجيا" من النوع (d) غير ممتلئ كليا" بالإلكترونات حيث وضعت هذه العناصر في منتصف الجدول الدوري وجميعها فلزات .

٤- العناصر الانتقالية الداخلية Inner transition metals :-

تمتلك هذه العناصر غلafa" ثانويا" من النوع (f) وتتألف من 14 عنصرا" والتي وضعت اسفل الجدول الدوري وتسمى أيضا" بعناصر اللانثانات والاكثينات.

تترتب الدورات بشكل افقي حيث تبدأ بفلز قلوي من عناصر الركن (S) وتنتهي بعنصر من عناصر الغازات النبيلة وهي مرتبة كما يأتي :-

١-الدورة الأولى (n=1): تحتوي عنصرين هما (1^H ، 2^{He})

٢- الدورتين الثانية (n=2) والثالثة (n=3) كل منهما تحتوي على 8 عناصر:

2nd period =Li (3) → Ne (10)

3rd period = Na (11) → Ar(18)

٣- الدورات الرابعة (n=4) والخامسة (n=5) كل منهما تحتوي 18 عنصر

4th period = K(19) → Kr(36)

5th period = Rb(37) → Xe (54)

٤- الدورة السادسة (n=6) تحتوي على 32 عنصر

6th period = Cs(55) → Rn (86)

٥- الدورة السابعة (n=7) وهي دورة غير مكتملة تحتوي على 23 عنصر

Fr (87) →

الكيمياء التحليلية Analytical Chemistry

تعرف الكيمياء التحليلية بكونها أحد فروع علم الكيمياء وهي الوسيلة الكيميائية التي يتم بها الكشف عن العناصر والمواد وطرق فصلها ومعرفة مكونات تلك المواد وتقدير هذه المكونات تقديراً كميّاً.

اذن تشمل الكيمياء التحليلية على التحليل النوعي والتحليل الكمي حيث يختص التحليل النوعي بمعرفة نوع العناصر الموجودة في المركب او نوع المركب اما التحليل الكمي فيختص بتقدير كمية كل عنصر موجود او تقدير كمية المركب.

وللكيمياء التحليلية اهمية في اجراء البحوث العلمية الصرفة والتطبيقية حيث نلاحظ ان العقاقير الطبية يجب ان تحتوي على نسبة معينة كي تؤدي عملها داخل الجسم حيث يبرز دورها في تقدير النسبة الموجودة منه والتأكد من حدود النسبة المئوية المسموح بها ليقوم العقار الطبي بأداء عمله بصورة مفيدة . كذلك في المجال الصناعي فإنه ينبغي استعمال المواد الكيميائية بتراكيز معينة كي نحصل على منتوج بالشكل المطلوب ، وكذلك المجال الزراعي .

الكيمياء التحليلية (التحليل الكيميائي)

ينقسم التحليل **الكمي** الى :

أ: تحليل حجمي (ويستند على حساب حجم المادة لقياس تركيزها او حساب النسبة المئوية)

ب: تحليل وزني (يتم فصل المادة المراد تحليلها بصورة منفردة او مشتركة بالترسيب او الطرد المركزي)

ج: تحليل آلي (يتضمن استخدام جهاز او آلة لقياس بعض الصفات ذات العلاقة بالتركيز مثل اللون ، الحامضية ، التوصيل الحراري والكهربائي والكثافة)

مبادئ التحليل الحجمي Principles of volumetric analysis

التسحيح Titration:- تتضمن عملية التسحيح تفاعل حجم معين من المادة المراد تحليلها مع المحلول القياسي standard solution الذي يضاف من السحاحة (Burette) ويكون عادة معروف التركيز لذا يجب قياس حجم المحلول القياسي النازل من السحاحة والتي يتفاعل بصورة تامة مع المادة المراد تحليلها وبأستخدام العلاقة الآتية

$$C_1V_1(\text{eq.1}) = C_2V_2(\text{eq.2})$$

حيث C_1 تركيز المحلول القياسي (في السحاحة)

حيث V_1 حجم المحلول القياسي (النازل من السحاحة) اللازم للوصول الى نقطة التكافؤ

حيث C_2 تركيز المادة المراد تحليلها (مجهولة)

حيث V_2 حجم المادة المراد تحليلها

حيث eq.1 عدد مكافئات المحلول القياسي

حيث eq.2 عدد مكافئات المحلول المراد تحليله.

المحلول القياسي - Standard Solution :-

وهو المحلول الذي يحتوي الحجم المعين منه على وزن مضبوط من مادة قياسية أولية primary standard substance اي تركيزه ثابت لا يتغير بمرور الزمن ومن الشروط الواجب توفرها في المحلول القياسي :-

- ١- يجب ان تكون نقاوته 100% او لا تتجاوز نسبة الشوائب الموجودة فيه على 0.02 – (0.01) ويجب ان تكون نسبة الشوائب معلومة بدقة.
- ٢- استقرارها عالي (لا تتأثر بالمحيط الخارجي) عند درجة الحرارة الاعتيادية ويجب ان تجفف دائماً قبل الوزن.
- ٣- يجب ان تكون سهلة الذوبان في الماء تحت الظروف التي يستعمل فيها.
- ٤- يجب ان تكون وزنها المكافيء كبيراً لتلافي اخطاء الوزن.
- ٥- يجب ان لا يكون محلول المادة القياسية ملوناً قبل أو بعد انتهاء عملية التسحيح منعاً لتداخل لونها مع لون الدليل المستعمل لأيجاد نقطة انتهاء التفاعل.
- ٦- ان يكون التفاعل مع المادة القياسية من التفاعلات التي تظهر تماماً عند نقطة التكافؤ وان يتم بسرعة.
- ٧- يجب ان لا تتأثر بالضوء ودرجات الحرارة والغبار والمواد العضوية.

مصطلحات التعبير عن كمية المادة المذابة :-

للتعبير عن كمية المادة المذابة نستعمل بعض المصطلحات الآتية :-

١- الوزن الذري الغرامي Gram – Atomic weight

وهو الوزن الذري للعنصر مقدراً بالغرامات والذي يحتوي على عدد معين من الذرات المسمى بعدد افوكادروا والذي يساوي 6.02×10^{23} .
مثال: O=16 ، H=1 ، C=12 و وحداته هي غرام/مول
(g mol⁻¹)

٢- الوزن الجزيئي الغرامي Gram Molecular weight

وهو وزن الصيغة الجزيئية للمركب او العنصر مقدراً بالغرامات ويحسب وزن الصيغة الجزيئية للمركب على اساس مجموع الاوزان الذرية للعناصر الداخلة في تكوينه

$$\begin{aligned} \text{M.wt CH}_3\text{COOH} &= 2\text{C} + 4\text{H} + 2\text{O} \\ &= 2 \times 12 + 4 \times 1 + 2 \times 16 \\ &= 60 \text{ g mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{M.wt H}_2\text{SO}_4 &= 2\text{H} + \text{S} + 4\text{O} \\ &= 2 \times 1 + 32 + 4 \times 16 \\ &= 98 \text{ g mol}^{-1} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{M.wt NH}_4\text{Cl} &= \text{N} + 4\text{H} + \text{Cl} \\ &= 1 \times 14 + 4 \times 1 + 1 \times 35.5 \\ &= 53.5 \text{ g mol}^{-1} \end{aligned}$$

٣- الوزن المكافئ الغرامي Gram – equivalent weight

هو الوزن المكافئ لعنصر او المركب مقدراً بالغرامات

$$\text{ex : H}_2\text{SO}_4 \quad , \quad \text{M.wt} = 98 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{eq.wt} &= \frac{\text{M.wt}}{n\text{H}} = \frac{98}{2} \\ &= 49 \text{ g.eq}^{-1} \end{aligned}$$

$$\text{ex : NaOH} \quad , \quad \text{M.wt} = 40 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{eq.wt} &= \frac{\text{M.wt}}{n\text{OH}} = \frac{40}{1} \\ &= 40 \text{ g.eq}^{-1} \end{aligned}$$

أ- الوزن المكافئ للعنصر:- هو عدد اوزان العنصر التي تتحد او تحل محل ثمان وحدات من الاوكسجين او من الهيدروجين.

ويرتبط الوزن الذري للعنصر مع وزن المكافئ بالعلاقة الآتية:-

$$\text{eq.wt} = \frac{\text{A.wt}}{\text{Valence}} \quad \frac{\text{الوزن الذري}}{\text{التكافؤ}}$$

$$\text{ex : eq.wt}_{\text{Cl}^-} = \frac{\text{A.wt Cl}}{\text{Valence}} = \frac{5.53}{1} = 35.5 \text{ g.eq}^{-1}$$

$$\text{eq.wt}_{\text{Na}^+} = \frac{\text{At.wt Na}}{\text{Valence}} = \frac{23}{1} = 23 \text{ g.eq}^{-1}$$

ب- الوزن المكافئ للحامض:- ويساوي وزن الصيغة الجزيئية مقسوماً على عدد ذرات الهيدروجين القابلة للحلال.

$$\text{eq.wt}(\text{acid}) = \frac{\text{M.wt}(\text{acid})}{n(\text{H})} = \text{g.eq}^{-1}$$

$$\text{eq.wt}(\text{CH}_3\text{COOH}) = \frac{60}{1} = 60 \text{ g.eq}^{-1}$$

ج- الوزن المكافئ للقاعدة:- ويساوي وزن الصيغة الجزيئية مقسوماً على عدد مجاميع الهيدروكسيل (OH^-) الفعالة القابلة للحلال

$$\text{KOH}, \text{NaOH}, \text{LiOH} = \frac{\text{M.wt}}{1}$$

$$\text{Ca}(\text{OH})_2, \text{Mg}(\text{OH})_2 = \frac{\text{M.wt}}{2}$$

$$\text{Al}(\text{OH})_3, \text{Fe}(\text{OH})_3 = \frac{\text{M.wt}}{3}$$

د- الوزن المكافئ للاملاح:- وهو وزن الصيغة الجزيئية مقسوماً على ذرات الفلز مضروباً في تكافؤه

$$\text{AgCl}, \text{KCl}, \text{NaCl}, \text{NaNO}_3 = \frac{\text{M.wt}}{1 \times 1}$$

5- الوزن المكافئ للعامل المختزل والعامل المؤكسد:- هو وزنها الجزيئي مقسوماً على عدد الالكترونات المفقودة او المكتسبة لمول واحد فقط.

العامل المؤكسد Oxidant factor: هي المادة التي تؤكسد غيرها و تختزل هي اي تكتسب الالكترونات.

العامل المختزل Reducing factor: هي المادة التي تختزل غيرها وتتأكسد هي اي تفقد الالكترونات.

$$\text{eq.wt KMnO}_4 = \frac{\text{M.wt}}{\text{عدد } e \text{ المكتسبة}} = \frac{\text{M.wt}}{5}$$

(عامل مؤكسد)

$$\text{eq.wt FeSO}_4 = \frac{\text{M.wt}}{\text{عدد } e \text{ المفقودة}} = \frac{\text{M.wt}}{1}$$

(عامل مختزل)

عامل مختزل عامل مؤكسد

$$\text{eq.wt of FeCl}_3 = \frac{\text{M.wt FeCl}_3}{1}$$

$$\text{eq.wt of SnCl}_2 = \frac{\text{M.wt SnCl}_2}{2}$$

طرق التعبير عن التراكيز: - من اهم طرق التعبير عن التركيز ما يلي: -

١- المولالية (التركيز المولالي (m) Molality

٢- المولارية (التركيز المولاري (M) Molarity

٣- النورمالية (العيارية (N) Normality

٤- التركيز بالجزء بالمليون Ppm part per Million

٥- التركيز بالنسبة المئوية الوزنية Weight percentage concentration % W/w

٦- التركيز بالنسبة المئوية الحجمية Volume percentage concentration % V/v

المولارية : هو عدد مولات المذاب في لتر واحد من المحلول وتقاس بوحدات (مول / لتر) او مولاري

$$\text{Molarity} = \frac{\text{Moles of solute}(n)}{\text{volume of solution (l)}}$$

$$n = \frac{\text{wt.of solute}(gm)}{\text{volume of solution}(l)}$$

$$1 \text{ liter} = 1000 \text{ ml} = 100 \text{ cm}^3$$

وبالنسبة للمواد الصلبة solids

$$\text{Molarity} = \frac{\text{wt (gm)}}{\text{M.wt}} \times \frac{1000}{v(\text{ml or cm}^3)}$$

اما للمواد السائلة liquids

$$M = \frac{\% \times (d \text{ or sp.Gr}) \times 1000}{\text{M.wt}}$$

d تمثل كثافة السائل

Sp.Gr تمثل الوزن النوعي للسائل

% تمثل النسبة المئوية لنقاوة السائل

$$M1 \times V1 = M2 \times V2$$

معادلة التخفيف

بعد التخفيف قبل التخفيف

مثال: اذيب 5.3 غم من كاربونات الصوديوم Na_2CO_3 في الماء المقطر ثم اكمل الحجم الى ربع لتر . احسب مولارية المحلول ؟ علما ان الاوزان الذرية للكربون (12) ، الاوكسجين (16) ، الصوديوم (23) كما يأتي :-

$$\text{M.wt of Na}_2\text{CO}_3 = (16 \times 3 + 12 \times 1 + 23 \times 2) = 106 \text{ g/mol}$$

$$M = \frac{5.3}{106} \times \frac{1000}{250}$$

$$= 0.2 \text{ Mol/L}$$

مثال : ما وزن هيدروكسيد الصوديوم اللازم لتحضير نصف لتر من محلول 0.1 مولاري
علما ان الاوزان الذرية O = 16 ، H = 1 ، Na = 23

$$M .wt \text{ of NaOH} = 1 \times 1 + 1 \times 16 + 1 \times 23 = 40 \text{ g/mol}$$

$$0.1 = \frac{wt}{40} \times \frac{1000}{500} = 2 \text{ g of NaOH}$$

نأخذ 2 غم من NaOH ونخففه بالماء المقطر الى نصف لتر .

مثال // احسب التركيز المولاري لمحلول حامض الكبريتيك اذا علمت ان نسبة 98 %
ووزنه النوعي 1.84 sp .Gr ؟

$$M = \frac{\% \times sp.Gr \times 1000}{M.wt}$$

$$= \frac{\frac{98}{100} \times 1.84 \times 1000}{98}$$

$$= 18.4 \text{ m.mol/m}$$

٢- النورمالية (العيارية) Normality (N)

وهي عدد المكافئات الغرامية للمادة المذابة في لتر واحد من المحلول وتقاس بوحدات مكافئ غرامي / لتر g.eq / L ويرمز لها بالرمز N .

$$\text{Normality} = \frac{\text{No. of Gram Equivalents of the Solute}}{\text{Volume of Solution (L)}}$$

$$\text{No. of Gram equivalents} = \frac{\text{wt}}{\text{gm Eq.wt}}$$

ويمكن تمثيلة بالعلاقة الآتية :-

$$N = \frac{\text{wt (gm)}}{\text{Eq. wt}} \times \frac{1000}{V(\text{ml or cm}^3)} \quad \text{1- للمواد الصلبة Solids}$$

$$N = \frac{\% \times (d \text{ or Sp.Gr}) \times 1000}{\text{Eq.wt}} \quad \text{2- للسوائل Liquids}$$

$$N_1 \times V_1 = N_2 \times V_2 \quad \text{معادلة التخفيف}$$

بعد التخفيف قبل التخفيف

مثال // احسب مولارية وعيارية محلول على 10.6 غم من كاربونات الصوديوم Na_2CO_3 في لتر واحد من محلوله المائي :-

$$\text{M.wt of } \text{Na}_2\text{CO}_3 = 106 \text{ g/mol}$$

$$M = \frac{\text{wt}}{\text{M.wt}} \times \frac{1000}{V \text{ of solution (ml)}}$$

$$M = \frac{10.6}{106} \times \frac{1000}{1000} = 0.1 \text{ Mole/L (Molar)}$$

$$N = \frac{\text{wt}}{\text{eq.wt}} \times \frac{1000}{V(\text{ml})}$$

$$\text{eq.wt of Na}_2\text{CO}_3 = \frac{M.wt}{2 \times 1} = \frac{106}{2} = 53$$

$$N = \frac{10.6}{53} \times \frac{1000}{1000} = 0.2 \text{ N (g.eq /L)}$$

س/ ماهي العلاقة بين التركيز المولاري والتركيز النورمالي؟

ويمكن اشتقاقها

$$M = \frac{wt}{V \times M.wt} \dots\dots 1 \quad N = \frac{wt}{V \times \text{eq.wt}}$$

$$M \times \cancel{V} \times M.wt = N \times \cancel{V} \times \text{eq.wt}$$

$$M \times \cancel{M.wt} = N \times \frac{M.wt}{n}$$

$$M = \frac{N}{n} \longrightarrow N = nM$$

س/ إذا طلب منك تحضير 2.5M Hcl من حجم 500ml من محلول Hcl الذي تكون كثافته 1.145 g/ml ونسبة نقاوته 32%، علماً بأن الكتلة المولية له (36.5 g/mol) فما هو عدد المليترات من Hcl المركز اللازمة لذلك؟

أولاً: - يتم تحديد مولارية الحامض المركز من العلاقة

$$M = \frac{\text{density} \times \text{percentage} \times 1000}{M.wt}$$

$$M = \frac{1.145 \times \frac{32}{100} \times 1000}{36.5} = 10.04$$

$$M_1 V_1 = M_2 V_2$$

$$10.04 \times V_1 = 2.5 \times 500$$

$$V_1 = 124.5 \text{ mL}$$

لذا يتم سحب 124.5 وتوضع في قنينة حجمية سعتها 500 مل ويكمل الحجم بالماء المقطر.

٣- النسبة المئوية الوزنية (w/w) % والنسبة المئوية الحجمية (v/v) %

$$\%(\text{w/w}) = \frac{w \text{ solute (g)}}{w \text{ solution (g)}} \times 100$$

$$(\text{v/v}) = \frac{V \text{ solute (ml)}}{V \text{ solution (ml)}} \times 100$$

مثال // احسب النسبة الحجمية لمحلول حضر بأضافة 50ml من الكحول المثيلي الى 200ml من الماء. مع الافتراض بأن هذه الحجوم قابلة للإضافة.

$$V_{\text{solution}} = V_{\text{solute}} + V_{\text{solvent}} = 200 + 50 = 250 \text{ml}$$

مذيب مذاب محلول

$$\%(\text{v/v}) = \frac{50}{250} \times 100 = 20\%$$

مثال // احسب النسبة النسبة الوزنية لمحلول حضر بإذابة 5g من AgNO_3 في 100ml من الماء مفترضاً بأن كثافة الماء تساوي 1 g/ml

$$W_{\text{solvent}} = \rho \times v$$

$$= 1 \times 100$$

$$= 100 \text{g}$$

$$W_{\text{solution}} = W_{\text{solvent}} + W_{\text{solute}}$$

$$= 100 + 5 = 105$$

$$\% w/w = \frac{5}{105} \times 100 = 4.76 \%$$

مثال:- احسب مولارية محلول $Al_2(SO_4)_3$ الذي تركيزه 0.3N ؟

$$nM = N$$

n عدد المكافئات الغرامية وبما انه $Al_2(SO_4)_3$ من الاملاح فإن n للملح تحسب من العلاقة الآتية = عدد ذرات الفلز × تكافؤه

$$n = 3 \times 2 = 6$$

$$M = \frac{N}{n} = \frac{0.3}{6} = 0.05 \text{ Molar}$$

مثال// احسب التركيز النورمالي لمحلول $Bi(NO_3)_3$ الذي مولاريتته $M = 0.2$

$$n = 3$$

$$nM = N$$

$$N = 0.2 \times 3$$

$$= 0.6 \text{ N}$$

٤- التركيز بالجزء بالمليون (PPm) :-

ويمثل عدد الملغرامات من المادة المذابة في لتر من المحلول او المذيب المائي.

$$(PPm) = \frac{\text{mass of solute}}{\text{mass of solution}} \times 10^6$$

أي (Solution) / Liter (Solution) / milligrams

micrograms / milliter (Solution) او

milligrams /Kilogram (Solids) او

Micrograms / gram (solids)

$$2.34 \text{ ppm} = 2.34 \text{ mg/L} \quad // \text{ مثال}$$

العلاقة التي تربط ppm ب mg هي

$$\text{mg} = \frac{\text{ppm} \times \text{Vml}}{1000}$$

مثال // 3800 مل من محلول يحتوي على الكحول الايثيلي بنسبة (10ppm) فكم ملغم يحتوي المحلول من هذا الكحول ؟

$$\text{PPm} = \frac{\text{mg}}{\text{Liter}} \quad \text{or} \quad \frac{\text{mg}}{1000\text{ml}}$$

$$\therefore 10 \text{ mg} \quad 1000\text{ml}$$

$$\quad \quad \quad \times \quad 3800\text{ml}$$

$$X = \frac{10\text{mg}}{1000\text{ml}} \times 3800\text{ml} = 38 \text{ mg}$$

او نستخدم العلاقة بين ppm و mg

$$\text{mg} = \frac{\text{ppm} \times \text{Vml}}{1000} = \frac{10 \times 3800}{1000} = 38\text{mg}$$

اما العلاقة التي تربط بين المولارية و ppm هي :-

$$\text{Ppm} = M \times M.\text{wt} \times 1000$$

$$M = \frac{\text{ppm}}{M.\text{wt} \times 1000}$$

وتستخدم هذه العلاقة للتحويل بين ال ppm والمولارية .

مثال // محلول الفلوريد ($A_w = 19.0 \text{ g/mol}$) بتركيز 54.66 ppm ، عبر عن هذا التركيز بالمولارية.

$$M = \frac{54.66}{19 \times 1000} = 0.0029 \text{ Molar}$$

٥- المولالية (التركيز المولالي): - هو عدد مولات المذاب في 1000 غم من المذيب او هي عدد مولات المذاب في كيلو غرام من المذيب.

$$(m) \text{ Molality} = \frac{wt}{M.wt} * \frac{1000}{wt \text{ of solvent (g)}}$$

مثال // احسب التركيز المولالي لمحلول NaoH المحضر من اذابة 4 اغرام من NaoH في 500 غرام من الماء؟

$$(m) \text{ Molality} = \frac{4}{40} * \frac{1000}{500} = 0.2 \frac{\text{mol}}{\text{kg}} \text{ or (molal)}$$

مثال // أضاف طالب في احدئ التجارب 4.5 g من Nacl الى 100.0 g من الماء احسب مولالية المحلول؟

$$M.wt \text{ of Nacl} = 23 + 35.5 = 58.5 \text{ g / mol}$$

$$m = \frac{4.5}{58.5} * \frac{1000}{100} = 0.769 \text{ mol/kg}$$

العامل الوزني Gravimetric factor (Gf):

هو وزن الصيغة او الوزن الذري للمادة المطلوب تحليلها الى وزن الصيغة للراسب ذو الوزن المعلوم ولا تعتمد قيمته على وزن النموذج الأصلي وهو كمية ثابتة. او كتعريف ابسط هو الوزن الجزئي للمادة المبحوث عنها مقسوماً على الوزن الجزئي للمادة التي وزن على شكلها. مثال على ذلك عند وزن الكبريت على شكل كبريتات الباريوم $BaSO_4$ تكون قيمة المعامل الوزني :

$$Gf = \frac{At.wt(s)}{M.wt(BaSO_4)}$$

ويجب مراعاة الموازنة في كل من البسط والمقام ففي المثال أعلاه يكون الكبريت موجود في كل من البسط والمقام، لكن عند تعيين الحديد في خام Fe_2O_3 فيكون المعامل الوزني :-

$$Gf = \frac{2*At.wt(Fe)}{M.wt of (Fe_2O_3)}$$

كما يمكن حساب المعامل الوزني من النسبة بين اوزان المادة المراد تقديرها الى المادة الموزونة على هيئتها فمثلاً عند وزن الكلورايد على هيئة كلوريد الفضة فإن Gf :-

$$Gf = \frac{wt\ cl}{wt\ Agcl}$$

$$\frac{At.wt\ cl}{M.wt\ Agcl} = \frac{wtcl}{wt\ Agcl}$$

$$wt_{cl} = wt_{Agcl} * Gf$$

العامل الوزني	المادة المترسبة	المادة المراد تحليلها
$Gf = \frac{A.wt\ I*1}{M.wt\ AgI}$	AgI	I
$Gf = \frac{A.wt\ cl*2}{M.wt\ Fecl_2}$	Fecl ₂	Cl
$Gf = \frac{A.wt\ cl*3}{M.wt\ Fecl_3}$	Fecl ₃	Cl

$$Gf = \frac{A.wt \text{ BiCl}_3 * 2}{M.wt \text{ Bi}_2\text{O}_3}$$

العامل الوزني	المادة الناتجة الموزونة	المادة المراد تقديرها
$\frac{A.wt.of \text{ Cl}}{M.wt.of \text{ AgCl}}$	AgCl	الكلورايد Cl^-
$\frac{M.wt.of \text{ SO}_4^{2-}}{M.wt.of \text{ BaSO}_4}$	BaSO ₄	الكبريتات SO_4^{2-}
$\frac{A.wt.of \text{ Fe} \times 2}{M.wt.of \text{ Fe}_2\text{O}_3}$	Fe ₂ O ₃	الحديد Fe
$\frac{A.wt.of \text{ In} \times 2}{M.wt.of \text{ In}_2\text{O}_3}$	In ₂ O ₃	الإنديوم In
$\frac{M.wt.of \text{ HgO}}{M.wt.of \text{ Hg}_5(\text{IO}_6)_2}$	Hg ₅ (IO ₆) ₂	أوكسيد الزئبق HgO
$\frac{A.wt.of \text{ I} \times 2}{M.wt.of \text{ Hg}_5(\text{IO}_6)_2}$	Hg ₅ (IO ₆) ₂	اليوديد I^-
$\frac{A.wt.of \text{ P} \times 2}{M.wt.of \text{ Mg}_2\text{P}_2\text{O}_5}$	Mg ₂ P ₂ O ₅	الفسفور P

كما يمكن استخدام العلاقة الآتية لحساب النسبة المئوية للمادة المحللة

$$\% \text{ analyte (مادة محللة)} = \frac{wt \text{ الراسب} * Gf * 100}{wt \text{ النموذج}}$$

مثال // عند تحليل نموذج وزنه 1.5 g يحتوي على الكلورايد اضعيف مكون الى محلوله لتكون راسباً من كلوريد الفضة وزنه 0.9214 غرام. ما هي النسبة المئوية لكلوريد النموذج المذكور؟

$$Gf = \frac{A.wt \text{ cl}}{M.wt \text{ Agcl}} = \frac{35.5}{143.34} = 0.247$$

$$Gf = \frac{wt \text{ cl}}{wt \text{ Agcl}} \Rightarrow 0.247 = \frac{wt \text{ cl}}{0.9214}$$

$$\therefore wt \text{ cl} = 0.228 \text{ g}$$

$$\% \text{ cl} = \frac{wt \text{ cl}}{wt \text{ sample}} * 100$$

$$= \frac{0.228 \text{ g}}{1.5 \text{ g}} * 100 = 15.2 \% \text{ cl}$$

ويمكن استخدام العلاقة مباشرة بعد حساب Gf

$$\% \text{ cl} = \frac{Gf * w \text{ Agcl}}{w \text{ sample}} * 100$$

$$= \frac{0.247 * 0.9214 * 100}{1.5} = 15.17 \% \text{ cl}$$

❖ عمليات التحليل الحجمي Volumetric Analysis

التسحيح Titration: - تتضمن عملية التسحيح تفاعل حجم معين من المادة المراد تحليلها Analyte مع المحلول القياسي (standard solution) الذي يضاف من السحاحة Burette ويكون عادة معروف التركيز لذا يجب قياس حجم المحلول القياسي (Titrant) الذي يتفاعل بصورة تامة مع المادة المراد تحليلها (Analyte)

❖ أنواع التسحيحات: -

1- **تسحيحات الحامض: - قاعدة Acid – base Titration** يتم فيها تسحيح مركبات كثيرة عضوية ولا عضوية وحوامض او قواعد مع محلول قياسي يكون قاعدة قوية او حامض قوي ويمكن تميز نقطة انتهاء التفاعل في هذه التسحيحات بسهولة اما باستخدام دليل ملائم مثل

الفينولفثالين او المثيل البرتقالي او البرومو فينول الأزرق او متابعة التغير الحاصل في الاس الهيدروجيني (PH) بواسطة مقياس الاس الهيدروجيني (PH meter).

اسم الدليل	اللون في الوسط الحامضي	اللون في الوسط القاعدي
الفينولفثالين	عديم اللون	احمر
المثيل البرتقالي	احمر	احمر
البروموفينول الازرق	اصفر	ازرق

٢- تسحيحات الترسيب precipitation titration :-

يتكون راسب نتيجة تفاعل المادة القياسية المسححة مع المادة المحللة كما في تسحيح كما في تسحيح ايونات الكلوريد مع محلول نترات الفضة القياسي يتكون كلوريد الفضة Agcl

وتستخدم الدلائل أيضا لتمييز نقطة الانتهاء حيث يعطي لون مختلف ومميز عندها.

٣- تسحيحات اكسدة: - اختزال Oxidation – Redution titration

حيث يحصل فيها تفاعل بين عوامل مؤكسدة وعوامل مختزلة ومن اشهر العوامل المؤكسدة المستخدمة هي **برمنكنات البوتاسيوم**.

٤- تسحيحات التعقيد Complex formation

يتم فيها تحديد نسب العديد من ايونات الفلزات بتسحيحها مع الكواشف عضوية لها قابلية تكوين مركبات تناسقية معها قابلة للذوبان في الماء ومن امثلة هذه المواد هي مادة Ethylene diamine tetra acetic acid (EDTA)

تسحيحات حامض – قاعدة Acid – Base titration:

وهي التسحيحات المتضمنة تفاعل حامض او ملح حامضي مع قاعدة او ملح قاعدي لتكوين ملح وماء أي حتى الوصول الى وسط متعادل ($\text{pH} \approx 7$) لذلك تسمى أيضاً بتسحيحات التعادل

Neutrization titration

تتأين الحوامض عند اذابتها في الماء مكونة ايونات الهيدرونيوم H_3O^+ مثل تايين حامض الهيدروكلوريك وحامض النتريك

اما الحوامض المتعددة القاعدية (polybasic) مثل (H_3PO_4) فانها تتأين على مراحل ويمكن الاستدلال عليها عن طريق الدلائل :-

اما القواعد القوية فتعد قوية إذا كان تأينها تاماً وينتج عن تأينها المائي ايون الهيدروكسيل (OH^-)

اما القواعد الضعيفة مثل الامونيا (NH_3) فان تأينها غير تام :

الالكتروليت القوي :- يوجد بشكل ثلاث أنواع فهو اما حامض قوي او قاعدة قوية او املاح كثيرة الذوبان في الماء كما في الجدول:

قواعد قوية	حوامض قوية
$\text{KOH} \rightarrow \text{K}^+ + \text{OH}^-$ البوتاسيوم هيدروكسيد	$\text{HCl} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Cl}^-$ حامض الهيدروكلوريك
$\text{NaOH} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{OH}^-$ الصوديوم هيدروكسيد	$\text{HBr} \rightarrow \text{H}^+ + \text{Br}^-$ حامض الهيدروبرميك
$\text{Ba(OH)}_2 \rightarrow \text{Ba}^{+2} + 2\text{OH}^-$ الباريوم هيدروكسيد	$\text{HI} \rightarrow \text{H}^+ + \text{I}^-$ حامض الهيدرويوديك
$\text{Ca(OH)}_2 \rightarrow \text{Ca}^{+2} + 2\text{OH}^-$ الكالسيوم هيدروكسيد	$\text{HNO}_3 \rightarrow \text{H}^+ + \text{NO}_3^-$ حامض النتريك
$\text{Mg(OH)}_2 \rightarrow \text{Mg}^{+2} + 2\text{OH}^-$ المغنسيوم هيدروكسيد	$\text{HClO}_4 \rightarrow \text{H}^+ + \text{ClO}_4^-$ حامض الكلوريك
	$\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{SO}_4^{-2}$ حامض الكبريتيك
	$\text{H}_2\text{CrO}_4 \rightarrow 2\text{H}^+ + \text{CrO}_4^{-2}$ حامض الكروميك

اما الاملاح الشديدة الذوبان مثل

الالكتروليت الضعيف :- وهي مواد ينتج عن ذوبانها في الماء محاليل ضعيفة التوصيل للكهربائية لكونها تتأين بشكل جزئي في محاليلها المائية ويتم تمثيل تفكك هذا النوع من

التفكك بسهمين $\rightleftharpoons$ وتشمل الحوامض الضعيفة والقواعد الضعيفة والاملاح شحيحة الذوبان :

الحوامض الضعيفة :- وهي الكتروليتات ضعيفة تتفكك في الماء بشكل جزئي حيث تصل الى حالة التوازن بين الجزيئات المتفككة والجزيئات غير المتفككة ولكل حامض ثابت اتزان يرمز له (Ka) وهي :-

وتتفكك هذه الحوامض حسب المعادلة العامة لتفكك الحوامض الضعيفة الآتية :-

$$ka = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$$

حيث Ka ثابت تفكك الحامض الضعيف وهو مقياس لقدرة الحامض على التفكك فكلما كانت كبيرة فإن هذا يعني ان الحامض يتفكك بدرجة كبيرة .

القواعد الضعيفة :- هي الكتروليتات ضعيفة تتفكك بصورة جزيئة مثل :

والمعادلة العامة لتفكك القواعد الضعيفة هي

ثابت الاتزان لها :

$$kb = \frac{[BH^+][OH^-]}{[B]}$$

في معادلات تفكك القواعد يوجد الماء الا انه لا يدخل في الحسابات .

ثابت التأيين الذاتي للماء Kw :-

$$K_w = \frac{[H^+][OH^-]}{[H_2O]}$$

$$K_w[H_2O] = [H^+][OH^-]$$

$$K_w = [H^+][OH^-]$$

$$K_w = [H^+][OH^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

في المحاليل المتعادلة $10^{-7} = [OH^-] = [H^+]$

في المحاليل الحامضية $10^{-7} < [H^+]$ or $[OH^-] < [H^+]$

في المحاليل القاعدية $10^{-7} > [H^+]$ or $[OH^-] > [H^+]$

$$10^{-14} = [OH^-][H^+]$$

الحامضية تعني تركيز ايون $[H^+]$ والقاعدية مصطلح يعني تركيز $[OH^-]$.

الاس الهيدروجيني (الدالة الحامضية) PH_{vaule} :-

هو لو غار تيم تركيز ايون الهيدروجين مسبقاً بأشارة سالبة:-

$\text{PH} = -\log [\text{H}^+]$ اس هيدروجيني او دالة حامضية

$\text{POH} = -\log [\text{OH}^-]$ اس هيدروكسيلي او دالة قاعدية

$$\text{PH} + \text{POH} = 14, \text{PKw} = \text{PH} + \text{POH} = 14$$

$$\text{PKw} = -\log \text{kw}$$

في المحاليل المتعادلة $7 = \text{POH} = \text{PH}$

في المحاليل الحامضية $7 > \text{PH}$

في المحاليل القاعدية $7 < \text{PH}$.

ملاحظة: إذا كان PH معلوم نستطيع ايجاد تركيز $[\text{H}^+]$ منه بالقانون الآتي: -

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{PH}} \quad \text{or} \quad [\text{OH}^-] = 10^{-\text{POH}}$$

امثلة: - احسب pH محلول KOH بتركيز 0.005M ؟

$$0.005 \rightarrow 0 \quad 0$$

$$0 \quad 0.005 \quad 0.005$$

$$\therefore [\text{OH}^-] = -\log [\text{OH}^-] = -\log (5 \times 10^{-3})$$

$$\text{POH} = -\log \frac{5}{1000} = -\log 5 - \log 10^3$$

$$\text{POH} = 3 - 0.7 = 2.3$$

$$\text{PH} = 14 - \text{POH}$$

$$= 14 - 2.3 = 11.7$$

مثال // احسب PH ، POH وتركيز ايون الهيدروكسيل لمحلول التركيز المولاري لأيون الهيدروجين = $5 \times 10^{-3} \text{M}$

$$[\text{H}^+] [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$5 \times 10^{-3} [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$[\text{OH}^-] = \frac{1.0 \times 10^{-14}}{5 \times 10^{-3}} = 2 \times 10^{-12}$$

$$\text{PH} = -\log [\text{H}^+] = -\log 5 \times 10^{-3} = 2.3$$

$$\text{POH} = -\log [\text{OH}^-] = -\log 2 \times 10^{-12} = 11.7$$

Or

$$\text{PH} + \text{POH} = 14$$

$$2.3 + \text{POH} = 14$$

$$\text{POH} = 14 - 2.3 = 11.7$$

مثال :- احسب $[\text{OH}^-]$ لمحلول دالته الحامضية = 8

$$\text{PH} = 8 \quad (\text{الدالة الحامضية تعني PH})$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{PH}} \rightarrow [\text{H}^+] = 10^{-8}$$

$$[\text{H}^+] [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$10^{-8} [\text{OH}^-] = 1.0 \times 10^{-14}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-6}$$

او نتبع الطريقة الاتية :-

$$\text{PH} = 8$$

$$\text{PH} + \text{POH} = 14$$

$$8 + \text{POH} = 14 \rightarrow \text{POH} = 6$$

$$\text{OH}^- = 10^{-\text{POH}} \rightarrow [\text{OH}^-] 10^{-6}$$

مثال :- احسب $[\text{H}^+]$ لمحلول دالته القاعدية تساوي 4

$$\text{POH} = 4 \quad (\text{الدالة القاعدية تعني POH})$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-\text{POH}} \rightarrow [\text{OH}^-] = 10^{-4}$$

$$[\text{H}^+] [\text{OH}^-] = 10^{-14}$$

$$[\text{H}^+] \times 10^{-4} = 10^{-14}$$

$$[\text{H}^+] = \frac{10^{-14}}{10^{-4}} = 10^{-10}$$

او حل اخر: -

$$\text{POH} = 4$$

$$\text{PH} + \text{POH} = 14$$

$$\text{PH} = 14 - \text{POH}$$

$$= 14 - 4 = 10$$

$$[\text{H}^+] = 10^{-\text{PH}} = 10^{-10}$$

مثال: - احسب قيم الدالة الحامضية PH للمحاليل الآتية :

1- محلول حامض الهيدروكلوريك بتركيز $6 \times 10^{-4} \text{ M}$

2- محلول لحامض الكبريتيك بتركيز 0.03M علماً بأن $\log 6 = 0.78$

١- حامض HCl حامض قوي يتفكك بصورة تامة

$$\therefore [\text{H}^+] = 6 \times 10^{-4}$$

$$\text{PH} = - \log [\text{H}^+]$$

$$= - \log 6 \times 10^{-4}$$

$$= - (\log 6 + \log 10^{-4})$$

$$= - (0.78 - 4)$$

$$= 4 - 0.78 = 3.22$$

2- محلول حامض الكبريتيك بتركيز 0.03M

$$0 \qquad 0.06 \qquad 0.03$$

$$\therefore [H^+] = 0.06 = 6 \times 10^{-2} \text{ M}$$

$$PH = -\log [H^+]$$

$$PH = -\log 6 \times 10^{-2}$$

$$= -(\log 6 + \log 10^{-2})$$

$$= -(0.78 - 2)$$

$$= 2 - 0.78$$

$$PH = 1.22$$

مخطط يوضح خلاصة العلاقات الرياضية المستخدمة في حلول مسائل حساب الدالة الحامضية والقاعدية

-: الاملاح

يعرف الملح بأنه المادة المشتقة من حمض وقاعدة .

:ولهذا فإن للأملاح أربعة أنواع حسب إشتقاقها وهي

(١) الاملاح المتعادلة:- وهي املاح مشتقة من قاعدة قوية وحامض قوي اي أنها املاح ايونها

المشتق من NaCl الموجب يعود لقاعدة قوية وايونها السالب يعود لحامض قوي ، مثل القوية. وفق المعادلة التالية NaOH القوي وقاعدة HCl حامض :

7. للاملاح المتعادلة = pH قيمة ال

(٢) الاملاح الحامضية:- هي املاح ايونها الموجب يعود لقاعدة ضعيفة وايونها السالب يعود

كلوريد NH₄Cl حامض قوي اذن هي املاح مشتقة من حامض قوي وقاعد ضعيفة مثل : وفق المعادلة التالية NH₄ OH. و HCl الامونيوم المشتق من

(٣) الاملاح القاعدية:- هي املاح ايونها الموجب يعود لقاعدة قوية وايونها السالب يعود لحامض

ضعيف اذن هي املاح مشتقة من قاعدة قوية وحامض ضعيف مثل خلات الصوديوم . مثل خلات CH₃COOH وحامض ضعيف NaOH وهي مشتقة من قاعدة قوية CH₃COONa

الصوديوم والذي ينتج من تفاعل حمض الخليك مع هيدروكسيد الصوديوم وفق المعادلة التالية

أملاح مشتقة من أحماض ضعيفة وقواعد ضعيفة مثل خلات الأمونيوم التي تنتج من تفاعل - 4)

حمض الخليك مع هيدروكسيد الأمونيوم وفق المعادلة التالية

التحلل المائي للاملاح : هو تفاعل في حالة توازن ايوني بين الايون الموجب أو الايون

السالب أو كليهما مع الماء فيكون المحلول حامضي أو قاعدي او متعادل ، لذا تقسم الاملاح الى ثلاثة انواع :-

١- املاح حامضية :- هي املاح مشتقة من حامض قوي وقاعدة ضعيفة.

٢- املاح قاعدية :- هي املاح مشتقة من قاعدة قوية وحامض ضعيف.

٣- املاح متعادلة :- هي املاح مشتقة اما من حامض قوي وقاعدة قوية او حامض ضعيف وقاعدة ضعيفة.

١- القوانين الرياضية للاملاح الحامضية

ويتم ايجاده بالقانون الآتي:- K_h ثابت تفكك الملح يرمز له

$$K_h = \frac{k_w}{k_b}$$

K_w قيمته 1.0×10^{-14}

ثابت تفكك القاعدة الضعيفة المشتق منها الملح K_b .

في الاملاح الحامضية من العلاقة الآتية:- $[H^+]$ ب- يتم ايجاد تركيز

تركيز الملح C حيث

$$[H^+] = \sqrt{\frac{k_w \times c}{k_b}}$$

الاملاح الحامضية بالقانون الآتي:- pH ج- يتم ايجاد

$$pH = \frac{1}{2} (pK_w - pK_b - \log c)$$

(ثابت) $pK_w = 14$ حيث

٢- القوانين الرياضية للاملاح القاعدية:-

(ويتم ايجاده من العلاقة الآتية:- K_h ثابت تفكك الملح يرمز له

$K_w = 1 \times 10^{-14}$ (ثابت)

$$K_h = \frac{k_w}{k_a}$$

= ثابت تفكك الحامض الضعيف المشتق منه الملح K_a .

في الاملاح القاعدية من القانون الآتي:- $[H^+]$ يتم ايجاد تركيز

$$[H^+] = \sqrt{\frac{KWKa}{c}}$$

(يمثل تركيز الملح c حيث)

فهي نفسها اعلاه. ka و kw

الاملاح القاعدية بالقانون الآتي: $pH = -\log c$ - يتم ايجاد تركيز

$$pH = \frac{1}{2} (pKw + pKa + \log c)$$

(حفظ $PKw = 14$)

المحلول القاعدي	المحلول المتعادل	المحلول الحامضي
يكون تركيز $\text{OH}^- > \text{H}^+$	يكون تركيز $\text{H}^+ = \text{OH}^-$	تركيز $\text{OH}^- < \text{H}^+$
PH أكبر من 7	PH تساوي 7	PH أقل من 7

مثال ١: ما قيمة ثابت التحلل المائي لمخ خلات الصوديوم ؟ اذا علمت ان ثابت تفكك حامض الخليك $K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.8 \times 10^{-5}$

$$\text{مخ خلات الصوديوم ملح قاعدي} \quad \frac{1 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}} = K_h = \frac{k_w}{k_a}$$

$$0.56 \times 10^{-9} = 5.6 \times 10^{-10} = 10^{-9} \times \frac{1}{1.8} =$$

0.01 M محلول ملح خلات الصوديوم بتركيز $\text{pH} =$ مثال ٢: احسب قيمة

$K_a(\text{CH}_3\text{COOH}) = 1.8 \times 10^{-5}$ علماً ان 25c عند

$$\text{Log } 1.8 = 0.26, \sqrt{18} = 4.24, \text{log } 4.24 = 0.63$$

$$= \sqrt{\frac{1 \times 10^{-14} \times 1.8 \times 10^{-5}}{0.01}} \quad [\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_w K_a}{c}}$$

$$\sqrt{18 \times 10^{-18}} = \sqrt{1.8 \times 10^{-17}} = \sqrt{\frac{1.8 \times 10^{-19}}{1 \times 10^{-2}}} =$$

$$[\text{H}^+] = 4.24 \times 10^{-9}$$

$$\begin{aligned} \text{pH} &= -\log [\text{H}^+] = -\log 4.24 \times 10^{-9} \\ &= -\log 4.24 + \log 10^{-9} = -(0.63 - 9) \\ &= 9 - 0.63 \\ \text{pH} &= 8.37 \end{aligned}$$

علمياً KCN لمحلول ملح سيانيد البوتاسيوم $[\text{OH}^-]$ مثال ٣: احسب تركيز ايون الهيدروكسيد وهل المحلول حامضي ام قاعدي. $\text{Ka}(\text{HCN}) = 4.9 \times 10^{-10}$ وان 0.1 M ان تركيز الملح =

سيانيد البوتاسيوم ملح قاعدي

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_w K_a}{c}}$$

$$= \sqrt{\frac{1 \times 10^{-14} \times 4.9 \times 10^{-10}}{0.1}} = \sqrt{4.9 \times 10^{-23}} = \sqrt{\frac{4.9 \times 10^{-24}}{1 \times 10^{-1}}}$$

$$= \sqrt{49 \times 10^{-24}}$$

() $[\text{H}^+] = 7 \times 10^{-12}$ اصغر من $[\text{H}^+]$ المحلول قاعدي لان 10^{-7}

$$[\text{H}^+] [\text{OH}^-] = 1 \times 10^{-14}$$

$$= \frac{1 \times 10^{-14}}{[\text{H}^+]} = \frac{1 \times 10^{-14}}{7 \times 10^{-12}} = [\text{OH}^-]$$

$$10^{-2} = 0.143 \times 10^{-2} = 1.43 \times 10^{-3} \text{ M} \times \frac{1}{7} =$$

؟ اذا علمت ان قيمة 0.2 M محلول كلوريد الامونيوم بتركيز $\text{pH} =$ مثال ٤: كم هي قيمة $\text{Kb}(\text{NH}_3) = 1.8 \times 10^{-5}$ ثابت تفكك القاعدة

$$\text{Log } 1.8 = 0.26, \text{ log } 2 = 0.3$$

// الحل

$$pK_w = 14$$

$$pK_b = -\log K_b = -\log 1.8 \times 10^{-5} = -(\log 1.8 + \log 10^{-5})$$

$$pK_b = -(\log 1.8 + \log 10^{-5}) = -(0.26 - 5) = 5 - 0.26$$

$$pK_b = 4.74$$

$$\log c = \log 0.2$$

$$= \log 2 \times 10^{-1} = \log 2 + \log 10^{-1}$$

$$= 0.3 - 1 = -0.7$$

$$(pK_w - pK_b - \log c) \text{ pH} = \frac{1}{2}$$

$$14 - 4.74 + 0.7) \left(\frac{1}{2}\right) =$$

$$9.96) = 4.98 \left(\frac{1}{2}\right) =$$

0.5M بتركيز = 4.74 = pK_b(NH₃) محلول نترات الامونيوم pOH مثال ه: احسب قيمة
0.7 log 5 = وهل المحلول حامضي ام قاعدي

نترات الامونيوم ملح حامضي

$$pK_w = 14$$

$$pK_b = 4.74$$

$$\log c = \log 5 \times 10^{-1}$$

$$= \log 5 + \log 10^{-1} = 0.7 - 1 = -0.3$$

$$\text{pH} = \frac{1}{2} (pK_w - pK_b - \log c) =$$

$$\frac{1}{2}(14 - 4.74 + 0.3) =$$

$$(14.3 - 4.74) = \frac{1}{2}(9.56) = 4.78 =$$

7 اقل من pH لذلك المحلول حامضي لان

$$\text{pOH} = 14 - \text{pH}$$

$$\text{pOH} = 14 - 4.78 = 9.22$$

جدول علاقات الدوال الاسية واللوغارتمية

القواعد الأسية

القواعد اللوغارتمية

Exponent Rules	Logarithm Rules
$a^m \cdot a^n = a^{m+n}$	$\log(mn) = \log m + \log n$
$\frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$	$\log\left(\frac{m}{n}\right) = \log m - \log n$
$(a^m)^n = a^{mn}$	$\log m^n = n \log m$

التحلل المائي للاملاح: هو تفاعل في حالة توازن ايوني بين الايون الموجب أو الايون السالب أو كليهما مع الماء فيكون المحلول حامضي أو قاعدي أو متعادل ، لذا تقسم الاملاح الى اربعة انواع :-

- ٤- املاح حامضية :- هي املاح مشتقة من حامض قوي وقاعدة ضعيفة.
- ٥- املاح قاعدية :- هي املاح مشتقة من قاعدة قوية وحامض ضعيف.
- ٦- املاح متعادلة :- هي املاح مشتقة اما من حامض قوي وقاعدة قوية او حامض ضعيف وقاعدة ضعيفة.

٢- القوانين الرياضية للاملاح الحامضية

K_h ثابت تفكك الملح يرمز له K_h ويتم ايجاده بالقانون الآتي:-

$$K_h = \frac{k_w}{k_b}$$

K_w قيمته 1.0×10^{-14}

K_b ثابت تفكك القاعدة الضعيفة المشتق منها الملح .

ب- يتم ايجاد تركيز $[H^+]$ في الاملاح الحامضية من العلاقة الآتية:-

حيث C تركيز الملح

$$[H^+] = \sqrt{\frac{k_w \times c}{k_b}}$$

ج- يتم ايجاد PH الاملاح الحامضية بالقانون الآتي:-

$$PH = \frac{1}{2} (PK_w - PK_b - \log c)$$

حيث $PK_w = 14$ (ثابت)

٢- القوانين الرياضية للاملاح القاعدية:-

K_h ثابت تفكك الملح يرمز له (K_h) ويتم ايجاده من العلاقة الآتية:-

$$K_h = \frac{k_w}{k_a}$$

$$K_w = 1 \times 10^{-14} \text{ (ثابت)}$$

K_a = ثابت تفكك الحامض الضعيف المشتق منه الملح.

يتم إيجاد تركيز $[H^+]$ في الاملاح القاعدية من القانون الآتي:-

$$[H^+] = \sqrt{\frac{K_w K_a}{c}}$$

حيث (c) يمثل تركيز الملح

اما k_w و k_a فهي نفسها اعلاه.

ج- يتم إيجاد تركيز PH الاملاح القاعدية بالقانون الآتي:-

$$PH = \frac{1}{2} (PK_w + PK_a + \log c)$$

$$PK_w = (14) \text{ حفظ}$$

الاملاح القاعدية:- هي املاح ايونها الموجب يعود لقاعدة قوية وايونها السالب يعود لحامض ضعيف اذن هي املاح مشتقة من قاعدة قوية وحامض ضعيف مثل خلات الصوديوم CH_3COONa وهي مشتقة من قاعدة قوية $NaOH$ وحامض ضعيف CH_3COOH .

الاملاح الحامضية:- هي املاح ايونها الموجب يعود لقاعدة ضعيفة وايونها السالب يعود لحامض قوي اذن هي املاح مشتقة من حامض قوي وقاعد ضعيفة مثل NH_4Cl كلوريد الامونيوم المشتق من HCl و NH_3 .

الاملاح المتعادلة:- وهي املاح مشتقة من قاعدة قوية وحامض قوي اي أنها املاح ايونها الموجب يعود لقاعدة قوية وايونها السالب يعود لحامض قوي ، مثل $NaCl$ المشتق من حامض HCl القوي وقاعدة $NaOH$ القوية.

قيمة ال PH للاملاح المتعادلة = 7 .

مثال ١: ما قيمة ثابت التحلل المائي لملاح خلات الصوديوم ؟ اذا علمت ان ثابت تفكك حامض

$$\text{Kh} = \frac{K_w}{K_a} = \frac{1 \times 10^{-14}}{1.8 \times 10^{-5}}$$

$$= \frac{1}{1.8} \times 10^{-9} = 0.56 \times 10^{-9} = 5.6 \times 10^{-10}$$

مثال ٢: احسب قيمة PH محلول ملح خلات الصوديوم بتركيز = 0.01 M

$$\text{Log } 1.8 = 0.26, \sqrt{18} = 4.24, \text{log } 4.24 = 0.63$$

$$[\text{H}^+] = \sqrt{\frac{K_w K_a}{c}} = \sqrt{\frac{1 \times 10^{-14} \times 1.8 \times 10^{-5}}{0.01}}$$

$$= \sqrt{\frac{1.8 \times 10^{-19}}{1 \times 10^{-2}}} = \sqrt{1.8 \times 10^{-17}} = \sqrt{18 \times 10^{-18}}$$

$$[\text{H}^+] = 4.24 \times 10^{-9}$$

$$\text{PH} = -\text{log} [\text{H}^+] = -\text{log } 4.24 \times 10^{-9}$$

$$= -\text{log } 4.24 + \text{log } 10^{-9} = -(0.63 - 9)$$

$$= 9 - 0.63$$

$$\text{PH} = 8.37$$

مثال ٣: احسب تركيز ايون الهيدروكسيد $[\text{OH}^-]$ لمحلول ملح سيانيد البوتاسيوم KCN علماً ان تركيز الملح = 0.1 M وان $\text{Ka}(\text{HCN}) = 4.9 \times 10^{-10}$ وهل المحلول حامضي ام قاعدي.

$$[H^+] = \sqrt{\frac{KWKa}{c}}$$

سيانيد البوتاسيوم ملح قاعدي

$$= \sqrt{\frac{4.9 \times 10^{-24}}{1 \times 10^{-1}}} = \sqrt{4.9 \times 10^{-23}} = \sqrt{\frac{1 \times 10^{-14} \times 4.9 \times 10^{-10}}{0.1}}$$

$$[H^+] = \sqrt{49 \times 10^{-24}} = 7 \times 10^{-12} \quad (\text{المحلول قاعدي لان } [H^+] \text{ اصغر من } 10^{-7})$$

$$[H^+] [OH^-] = 1 \times 10^{-14}$$

$$[OH^-] = \frac{1 \times 10^{-14} \times 1 \times 10^{-14}}{7 \times 10^{-12} [H^+]}$$

$$= \frac{1}{7} \times 10^{-2} = 0.143 \times 10^{-2} = 1.43 \times 10^{-3} \text{ M}$$

مثال ٤: كم هي قيمة PH محلول كلوريد الامونيوم بتركيز = 0.2 M ؟ اذا علمت ان قيمة ثابت تفكك القاعدة $Kb_{(NH_3)} = 1.8 \times 10^{-5}$

$$\log 1.8 = 0.26 , \log 2 = 0.3$$

// الحل

$$Pkw = 14$$

$$Pkb = - \log kb = - \log 1.8 \times 10^{-5} = - (\log 1.8 + \log 10^{-5})$$

$$Pkb = - (\log 1.8 + \log 10^{-5}) = - (0.26 - 5) = 5 - 0.26$$

$$Pkb = 4.74$$

$$\log c = \log 0.2$$

$$= \log 2 \times 10^{-1} = \log 2 + \log 10^{-1}$$

$$= 0.3 - 1 = - 0.7$$

$$PH = \frac{1}{2} (pKw - pKb - \log c)$$

$$= \frac{1}{2} (14 - 4.74 + 0.7)$$

$$= \frac{1}{2} (9.96) = 4.98$$

مثال ٥: احسب قيمة POH محلول نترات الامونيوم $pKb(NH_3) = 4.74$ بتركيز $0.5M$ وهل المحلول حامضي ام قاعدي $\log 5 = 0.7$

$$pKw = 14$$

نترات الامونيوم ملح حامضي

$$pKb = 4.74$$

$$\log c = \log 5 \times 10^{-1}$$

$$= \log 5 + \log 10^{-1} = 0.7 - 1 = - 0.3$$

$$= pH = \frac{1}{2} (pKw - pKb - \log c)$$

$$= (14 - 4.74 + 0.3) \frac{1}{2}$$

$$= (14.3 - 4.74) = \frac{1}{2} (9.56) = 4.78 \quad \frac{1}{2}$$

لذلك المحلول حامضي لان pH اقل من 7

$$pOH = 14 - PH$$

$$pOH = 14 - 4.78 = 9.22$$

تأثير الايون المشترك :-

هو الايون الذي يقلل من تفكك الالكتروليت الضعيف الناتجة عن وجود الكتروليت قوي يحوي احد ايونات الالكتروليت الضعيف في نفس المحلول. وهو على نوعين

أ- محلول يحتوي (حامض ضعيف + ملح قاعدي)

مثل حامض الخليك الضعيف واذيف اليه ملح خلات الصوديوم (ملح قاعدي)

سوف يتكون بينها ايون متشابه يدعى بالايون المشترك وهو الخلات وحسب قاعدة لي شاتليه سيقوم بأزاحة الاتزان بالاتجاه العكسي للحامض مما يقلل

من تركيز $[\text{H}^+]$ في المحلول وتزداد PH لان العلاقة بينهما عكسية ويزداد تركيز الحامض غير المتفكك ويلخص تأثير الايون المشترك كالآتي :-

- ❖ يقلل من تركيز $[\text{H}^+]$ في المحلول .
- ❖ تزداد PH لان العلاقة بينهما عكسية .
- ❖ يزداد تركيز الحامض الغير متفكك .
- ❖ تقل درجة تفكك الحامض الضعيف .
- ❖ تقل النسبة المئوية لتفكك الحامض الضعيف .

ب - محلول يحتوي (قاعدة ضعيفة + ملحها الحامضي) : مثل الامونيا كقاعدة ضعيفة ونضيف اليها ملح كلوريد الامونيوم (وهو ملح حامضي) سوف يتكون بينهما ايون متشابه يدعى ايون مشترك وهو الامونيوم وحسب قاعدة لي شاتليه سيقوم بازاحة الاتزان بالاتجاه العكس للامونيا وعليه يقل تركيز $[\text{OH}^-]$ في المحلول وتقل PH لان العلاقة بينهما طردية ويزداد تركيز القاعدة الغير متفكك ويمكن تلخيص تأثير الايون المشترك كالآتي :

- ❖ يقلل من تركيز $[\text{OH}^-]$ في المحلول .
- ❖ تقل PH لان العلاقة بين $[\text{OH}^-]$ و PH طردية .
- ❖ يزداد تركيز القاعدة الغير متفكك .

- ❖ تقل درجة تفكك القاعدة الضعيفة .
- ❖ تقل النسبة المئوية لتفكك القاعدة الضعيفة .

درجة التفكك (درجة التأين) :- وهي النسبة بين كمية الصنف المذاب المتفككة عند الحالة الاتزان الى كمية الصنف المذاب الكلية أي النسبة بين المتأين الى الأصلي.

المحاليل المنظمة: (محاليل بفر):- هي محاليل مائية مكونة من مزيج لحامض ضعيف مع احد املاحه او قاعدة ضعيفة مع احد املاحها وتمتاز هذه المحاليل بقدرتها على مقاومة التغير في الـ PH عند اضافة كمية قليلة من حامض قوي او قاعدة قوية اليها. وهناك نوعين من المحاليل المنظمة هي:-

١- بفر حامضي : والتي تتكون من حامض ضعيف مع ملحه القاعدي ويمكن ايجاد PH من القانون :-

$$\text{PH} = \text{PKa} + \log \frac{[\text{salt}]}{[\text{acid}]}$$

عند اضافة حامض قوي يصبح القانون كالآتي:-

$$\text{PH} = \text{PKa} + \log \frac{[\text{salt}] - [\text{acid}]}{[\text{acid}] + [\text{acid}]}$$

اما عند اضافة قاعدة قوية يصبح القانون كالآتي:-

$$\text{PH} = \text{PKa} + \log \frac{[\text{salt}] + [\text{base}]}{[\text{acid}] - [\text{base}]}$$

٢- بفر قاعدي :- هي محاليل تتكون من قاعدة ضعيفة مع ملحها الحامضي ويتم ايجاد POH لها بالقانون كالآتي:-

$$POH = PKb + \log \frac{[salt]}{[base]}$$

عند اضافة حامض قوي يصبح القانون كالآتي:-

$$POH = PKb + \log \frac{[salt]+[acid]}{[base]-[acid]}$$

اما عند اضافة قاعدة قوية يصبح القانون كالآتي:-

$$POH = PKb + \log \frac{[salt]-[base]}{[base]+[base]}$$

تسحيحات التعادل :- وهي تسحيحات تستعمل في إيجاد كمية الحامض المكافئة للقاعدة او بالعكس عند حصول تفاعل كيميائي بين المحللة ومادة قياسية ، أي لمعرفة نقطة التكافؤ كما يمكن من خلالها معرفة الدليل المناسب لهذا التفاعل .

بناء منحنيات التسحيح :-

١- تسحيح حامض قوي مع قاعدة قوية.

الحوامض القوية مثل : HCl ، HBr ، HI ، H₂SO₄

القواعد القوية مثل : جميع هيدروكسيدات عناصر الزمرة الأولى والثانية

والشائعة الاستعمال هي NaOH ، KOH ، Ba(OH)₂

الدلائل المستعملة هي :

المثيل البرتقالي ويعمل في PH من 3.1 _ 4.4 (Red _ Orange)

المثيل الأحمر (4.2 _ 6.3) (yellow _ Red)

الفينولفتالين (8.3 _ 10.0) (Clear _ Red)

في هذا النوع من التسحيحات يجب اجراء ثلاث أنواع في الحسابات لبناء منحنيات التسحيح :-

١- قبل نقطة التكافؤ

٢- عند نقطة التكافؤ

٣- بعد نقطة التكافؤ . وسنوضح ذلك من خلال الأمثلة الآتية .

مثال 1 / تم تسحيح 50 مل من HCl (0.1M) مع محلول NaOH بتركيز (0.1M) احسب :-

أ- PH محلول HCl عند نقطة البداية

ب- بعد إضافة 5 مل من القاعدة

ج- بعد إضافة 50 مل من القاعدة

د- بعد إضافة 55 مل من القاعدة

الحل :

٤ يتحلل HCl في الماء بصورة تامة

	HCl	→	H ⁺	+	Cl ⁻
	0.1		0		0
قبل التحلل	- 0.1		+0.1		+0.1

إذا تركيز [H⁺] = 0.1 نحسب الـ pH :-

$$\text{pH} = -\log [\text{H}^+] = -\log 0.1 = 1$$

$$\text{pH} = 1$$

إذا عند البداية

٥ بعد إضافة 5 مل من NaOH

١- نحسب عدد ملي مولات الحامض في البداية $M \times V$

$$\text{n.of mmole acid} = M \times V_{\text{ml}} = 50 \times 0.1 = 5 \text{ mmole HCl}$$

للقاعدة المضافة ايضاً نفس الطريقة :

$$\text{n.of mmole base} = M \times V_{\text{ml}} = 0.1 \times 5 = 0.5 \text{ mmole NaOH}$$

$$5 - 0.5 = 4.5 \text{ mmole الحامض المتبقي}$$

تعاادل 0.5 mmole من القاعدة مع 0.5mmole والباقي 4.5mmole من الحامض نحسب منه الPH

$$[H^+] = \frac{4.5 \text{ mmole}}{\text{الحجم الكلي} [50+5]} = 8.18 \times 10^{-2}$$

$$\frac{\text{عدد المولات}}{\text{الحجم}} = \text{لان التركيز المولاري}$$

و الحجم اصبح = 50+5 لان الحجم الاول 50 و اضيف اليه 5 مل فيصبح الحجم الجديد 55 مل .

$$[H^+] = -\log [H^+] = -\log [8.18 \times 10^{-2}]$$

$$PH = 1.09$$

ج- بعد اضافة 50 مل من القاعدة

$$0.1 \times 50 = 0.1 \times 50$$

حامض قاعدة

إذاً تعادل كل الحامض مع كل القاعدة المضافة فتكون

$$[OH^-] = [H^+] \quad \text{لان} \quad pH=7$$

د- بعد اضافة 55 مل من NaOH

بعد هذه الاضافة سيصبح تركيز القاعدة اكثر من تركيز الحامض لذا نحسب pOH ومنها نحسب الpH

$$\text{mmole acid} = M \times V_{ml} = 50 \times 0.1 = 5 \text{ mmole} \quad \text{حامض}$$

$$\text{mmole base} = M \times V_{ml} = 55 \times 0.1 = 5.5 \text{ mmole} \quad \text{قاعدة}$$

$$\text{نأخذ الفرق بينهما} \quad 5.5 - 5 = 0.5 \text{ mmole}$$

(قاعدة)

$$[\text{OH}^-] = \frac{0.5}{55+50} = \frac{0.5}{105} = 4.7 \times 10^{-3}$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-] = -\log 4.7 \times 10^{-3} = 2.32$$

$$\text{pH} = 14 - \text{pOH} = 14 - 2.32 = 11.68$$

اي بأختصار اذا كان الاصلي هو حامض والمضاف قاعدة يمكنك استعمال العلاقات الاتية :-

بعد الاضافة الاولى من القاعدة

$$[\text{H}^+] = \frac{\text{عدد ملي مولات الحامض الاصلي} - \text{عدد ملي مولات القاعدة المضافة}}{\text{الحجم الكلي للمحلول}}$$

ثم نحسب الـ pH

ب - بعد إضافة حجم من القاعدة مساوي الى حجم الحامض بشرط ان يكون التركيز لكلاهما

متماثل ستكون قيمة الـ pH=7

ج- بعد ان يتعادل الحامض مع القاعدة فإن المضاف من القاعدة سيصبح اكثر من الحامض الأصلي نستعمل العلاقة الاتية بعد كل إضافة

$$[\text{OH}^-] = \frac{\text{عدد ملي مولات القاعدة المضافة} - \text{عدد ملي مولات الحامض الاصلي}}{\text{الحجم الكلي}}$$

ثم نحسب POH وبعدها نحسب من خلالها PH .

مثال:- اوجد الـ PH لمحلول 20 مل من حامض الهيدروكلوريك 0.05 مولاري ثم احسب التغير في PH عند إضافة الاحجام الاتية من محلول NaOH (0.05M)

(5 ، 19.9 ، 20 ، 25) مل وماهو الدليل المناسب للحصول على نقطة التكافؤ ؟

الحل :- كل من HCl و NaOH الكتروليتات قوية وتتأين تأين تام

١- قبل الإضافة حامض فقط $[H^+] = 0.05M$

$$pH = - \text{Log} [H^+] = - \text{Log} [0.05] = 1.3$$

وتمثل PH قبل الإضافة

٢- عند إضافة حجم 5 مل من NaOH (0.05M)

$$[H^+] = \frac{\text{عدد ملي مولات الحامض الاصيل} - \text{عدد ملي مولات القاعدة المضافة}}{\text{الحجم الكلي للمحلول}}$$

$$\frac{(0.05 \times 5) - (20 \times 0.05)}{20+5}$$

$$0.03 = \frac{0.75}{25} = \frac{0.25-1}{25}$$

$$pH = - \log [H^+] = 1.52$$

٣- بعد إضافة حجم 19.9 مل من NaOH (0.05M)

$$[H^+] = \frac{(0.05 \times 19.9) - (20 \times 0.05)}{20 + 19.9}$$

$$\frac{0.005}{39.9} = \frac{0.995 - 1}{39.9}$$

$$= 10^{-4} \times 1.25$$

$$pH = - \log [H^+] = -\log 1.25 \times 10^{-4} = 3.9$$

pH عند إضافة 19.9 مل من القاعدة

٤- عند إضافة 20 مل من NaOH (0.05M) فإن كل الحامض الأصلي سيتعادل مع القاعدة (إذا كان التركيز وعدد مكافئات الحامض والقاعدة متماثل) عندئذ تكون $pH = 7$ (المحلول متعادل)

٥- عند إضافة 20.1 مل من NaOH (0.05M)

سيصبح تركيز القاعدة المضافة أكثر من تركيز الحامض الأصلي عندئذ نحسب $[OH^-]$ ومنه نحسب pOH ثم نجد pH

$$[OH^-] = \frac{\text{عدد ملي مولات القاعدة المضافة} - \text{عدد ملي مولات الحامض الاصيل}}{\text{الحجم الكلي}}$$

$$\frac{(0.05 \times 20) - (0.05 \times 20.1)}{20 + 20.1}$$

$$[\text{OH}^-] = 10^{-4} \times 1.25$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-] = -\log (1.25 \times 10^{-4}) = 3.9$$

$$\text{pH} = 14 - \text{POH} = 14 - 3.9 = 10.1$$

٦- عند إضافة 25 مل من NaoH (0.05M)

$$[\text{OH}^-] = \frac{(0.05 \times 20) - (0.05 \times 25)}{25+20} = 5.6 * 10^{-3}$$

$$\text{pOH} = -\log [\text{OH}^-]$$

$$= -\log [5.6 \times 10^{-3}]$$

$$= 2.25$$

$$\text{pH} = 14 - 2.25$$

$$= 11.75$$

منحنيات تسحيح حامض ضعيف مع قاعدة قوية :

مثال:- HOCl (0.5M) 100ml ، تم تسحيحها مع NaOH (0.25M) علما" بأن ($K_a = 3.5 \times 10^{-8}$)

١- احسب حجم هيدروكسيد الصوديوم اللازم للوصول الى نقطة التكافؤ

٢- احسب pH عند إضافة حجم من NaoH (0 ، 50 ، 100 ، 200 ، 225)

الحل :-

أولاً : نكتب معادلة التفاعل

أ - (قاعدة) Base = Acid (حامض)

$$M_1 V_1$$

$$M_2 V_2$$

$$0.5 \times 100\text{ml} = 0.25 \times V_2$$

الحجم اللازم للوصول الى نقطة التكافؤ $V_{eq} = 200\text{ml}$

ب - في البداية قبل أي إضافة لدينا حامض ضعيف والذي يتفكك جزئياً في المعادلة :-

في البداية (I)	0.5	0	0
(c) تغيير	- X	+X	+X
(E) توازن	0.5 - x	x	x

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+][\text{OCl}^-]}{[\text{HOCl}]}$$

$$3.5 \times 10^{-8} =$$

$$\frac{x^2}{0.5 - x}$$

تُهمل لان ثابت تفكك الحامض جدا " قليل لذا فانها يمكن اهمالها بسبب قلة قيمتها

$$X^2 = 1.75 \times 10^{-8}$$

$$\sqrt{x^2} = \sqrt{1.75 \times 10^{-8}}$$

$$X = 1.323 \times 10^{-4}$$

وتمثل H_3O^+

$$\text{pH} = -\log [1.323 \times 10^{-4}]$$

$$\text{pH} = 3.88$$

للحامض الضعيف قبل أي إضافة

//٢ بعد إضافة NaOH (50ml) سيصبح لدينا بفر

قبل (B) →

تغير (C) →

بعد (A) →

أصبح المحلول بفر نستخدم العلاقة الاتية: -

$$\text{pH} = \text{pka} + \log \left[\frac{\text{قاعدة B}}{\text{حامض A}} \right]$$

$$\text{pka} = -\log \text{ka} = -\log 3.5 \times 10^{-8}$$

$$\text{pka} = 7.456$$

$$\text{pH} = 7.456 + \frac{0.0125}{0.0375} = 6.98$$

بعد إضافة 100 ml

$$\text{pH} = \text{pka} + \log \frac{0.025}{0.025}$$

$$\text{pH} = 7.456 + 0 = 7.456$$

بعد إضافة 200 ml

$$[\text{NaOCl}] = \frac{0.05}{\frac{200+100}{1000}} = \frac{0.05 \text{ Mol}}{0.3 \text{ L}} = 0.1667$$

$$K_b = \frac{1 \cdot 10^{-14}}{k_a} \quad (k_a \cdot k_b = k_w)$$

$$K_b = \frac{1 \cdot 10^{-14}}{3.5 \cdot 10^{-8}} = 2.857 \cdot 10^{-7}$$

$$K_b = 2.857 \times 10^{-7} = \frac{[\text{HOCl}][\text{OH}^-]}{[\text{OCl}^-]} = \frac{x^2}{0.1667-x}$$

$$x^2 = 2.857 \times 0.1667$$

$$x^2 = 4.763 \times 10^{-8}$$

نجد الطرفين

$$x = 2.182 \times 10^{-4} = [\text{OH}^-]$$

$$\text{poH} = 3.66$$

$$\text{PH} = 14 - 3.66 = 10.34$$

بعد إضافة 225ml

B	0.05	0.05625	0	$0.25 \times \frac{225}{1000}$ $= 0.0562$
C	-0.05	-0.05	+0.05	
A	0	0.0625	+0.05	

$$\text{poH} = 1.72$$

$$\text{PH} = 14 - 1.72 = 12.28$$

لحامض ضعيف وقاعدة قوية

لحامض قوي وقاعدة قوية

التحليل الطيفي

وهو احدى طرق التحليل الآلي والتي تستند على ظاهرة تداخل الاشعاع مع المادة حيث يحدث امتصاص او انبعاث او تشتت للاشعاع .

طبيعة الاشعاع الكهرومغناطيسي :-

The Nature of Electromagnetic Radiation

الاشعاع الكهرومغناطيسي (EMR) هو احد اشكال الطاقة والتي تنتقل في الفراغ بسرعة عالية وتأخذ اشكال متعددة مثل الضوء ، الاشعاع الحراري ، Microwaves ، IR ، X-Ray ، والموجات الراديوية Radio Waves وتمتلك EMR خصائص موجية ودقائقية.

مخطط يوضح اهم مناطق الطيف الكهرومغناطيسي

يطلق على التحليل الكيميائي المعتمد على قياس الامتصاص في جميع مناطق الطيف الكهرومغناطيسي بالقياس الامتصاصي Absorptiometry . حيث تعتمد على التداخل بين الفوتونات وجسيمات المادة .

اما مصطلح القياس اللوني Colorimetry فيختص بقياس امتصاص الاشعاع في المنطقة المرئية . اما القياس الطيفي Spectrophotometry فهو فرع من القياس الطيفي يختص بدراسة امتصاص الاشعاع الكهرومغناطيسي وانبعاثه كدالة للطول الموجي باستخدام Spectrophotometer .

يقسم الطيف الكهرومغناطيسي الى عدة مناطق اعتمادا على الاختلاف في الطاقة والتردد والطول الموجي والمناطق هي :-

مناطق الطيف الكهرومغناطيسي	اشعة كاما
	اشعة اكس X
	فوق البنفسجية UV
	المرئية Visible
	تحت الحمراء IR
	المايكروية Microwave
	الراديوية Radio wave
اعلى طاقة اعلى تردد اقل طول موجي	
اقل طاقة اقل تردد اعلى طول موجي	

التحليل الكمي بامتصاص الاشعاع الكهرومغناطيسي

عند توجيه حزمة اشعاع الى اناء زجاجي يحتوي على محلول فان شدة الاشعاع النافذة ستكون اقل من شدة الاشعاع الساقطة عليه وسبب النقصان الرئيسي هو امتصاص دقائق المحلول للطاقة الاشعاعية

على ماذا يعتمد الامتصاص لهذه الاشعاعات؟

يعتمد الامتصاص على تركيز الدقائق الموجودة في المحلول فكلما يزداد عدد الدقائق الماصة للإشعاع كلما قلت شدة الإشعاع النافذ بسبب زيادة عدد الجسيمات الماصة للإشعاع.

ما هي آلية امتصاص الإشعاع من قبل الدقائق؟

عند توجيه حزمة إشعاعية متوازية أحادية اللون شدتها (I_0) على أحد أوجه اناء وبعد مرورها مسافة (b) خلال العينة التي تحتوي على (N) من الدقائق الماصة للإشعاع تقل شدة الإشعاع النافذ من الجهة الأخرى إلى (It).

كلما يزداد التركيز كلما يزداد عدد الدقائق الماصة للإشعاع ويسبب نقصان أكبر في شدة الإشعاع كذلك سمك الخلية أيضاً له دور في شدة الامتصاصية فكلما يقل سمك الخلية يقل عدد الدقائق الماصة للإشعاع والتي تقع في مسار الإشعاع الشكل الآتي يوضح تأثير سمك الخلية والتركيز على شدة الإشعاع النافذ.

تناسب شدة الاشعاع الممتص تناسباً طردياً مع سمك الخلية (b) وتركيز الفصائل الماصة للاشعاع (c). اعطيت هذه العلاقة من قبل العالمان بير ولمبرت لذا تدعى هذه العلاقة بقانون بير- لمبرت Lambert-Beer Law وهو من القوانين المهمة في التحليل الكمي .

وينص قانون بير لمبرت :- الزيادة المتتالية في عدد الجزيئات المتماثلة الماصة للاشعاع والواقعة في طريق حزمة من اشعاع احادي اللون تمتص أجزاء متساوية من الطاقة الاشعاعية التي تمر بها.

ما المقصود بأحادي الطول الموجي او احادي اللون ؟

المقصود له قيمة معينة من الطول الموجي (λ) مثلا 470 nm وليس مدى (450-560) nm هذا متعدد الاطوال الموجية .

العلاقة الرياضية لهذا القانون :-

$$A = \epsilon bc$$

Absorbance = A

Molar absorptivity = ϵ

c = التركيز بوحدة مول/لتر ، تستعمل هذه العلاقة اذا كانت المادة الماصة للاشعاع معلومة الوزن الجزيئي .

اما اذا كانت المادة مجهولة الوزن الجزيئي ستكون العلاقة :-

$$A = abc$$

حيث a تعني الممتصية Absorptivity

يعبر عن التركيز بوحدة g/l, mg/l, ppm/l

اما النسبة المئوية للاشعاع النافذ فيعرف من المعادلة الآتية:-

$$T(\%) = 100 \frac{I}{I_0}$$

$$T = \frac{I}{I_0}$$

ويمكن ربط A مع النفاذية T من خلال المعادلة الآتية:-

$$A = \log 1/T$$

$$= \log 1 - \log T = 0 - \log T$$

$$A = -\log T$$

$$A = \log 1/T = \log \frac{1}{I_t/I_0} = \log I_0/I_t$$

$$A = \log I^\circ / I$$

$$T = I/I^\circ \text{ النفاذية}, \%T = I/I^\circ \times 100$$

$$A = 2 - \log \%T$$

فإذا كان $I = I^{\circ}$ فان هذا يعني ان الخلية فارغة اي ليس هناك امتصاص

يتكون $I < I^{\circ}$ فان هذا يعني حدوث امتصاص للاشعاع من قبل المادة

$I_t > I^{\circ}$ وهذه حالة مستحيلة لان من غير الممكن ان يدخل الاشعاع و الشدة عالية ويخرج بشدة اكبر.

حيث I° تعني الاشعاع الساقط ، I_t تعني الاشعاع النافذ

يتكون جهاز مطيافية الامتصاص والذي يعمل ضمن منطقة منطقة الاشعة فوق البنفسجية- المرئية من الاشعاع الكهرومغناطيسي ، من :-

(1) مصدر اشعاع يوفر اطوال موجية تقع في منطقة UV-Visible لها اطوال موجية بين (800-100) نانوميتر nm

(2) موحد اللون (عازل الاطوال الموجية) Wave length selector

(3) خلية النموذج والتي تدعى ب (Cuvett):- يشترط في هذه التقنية ان تكون المادة بشكل محلول رائق كما يجب استعمال خلايا مصنوعة من الكوارتز في منطقة ذات اطوال موجية اقل من 380 nm ولا يمكن استعمال الزجاج لانه يمتص هذه الاطوال الموجية ، اما عند اطوال موجية اعلى فيمكن استعمال الزجاج او البلاستيك اضافة الى الكوارتز.

(4) المكشاف

(5) المسجل (وحدة معالجة البيانات)

ويستعمل هذا الجهاز لتقدير تراكيز مواد مجهولة التركيز من معرفة مقدار امتصاصها للاشعاع حيث ان العلاقة التي تربط التركيز بالامتصاص علاقة طردية حسب قانون بير-لمبرت ونصه الرياضي:-

$$A = \epsilon bc$$

حيث $A =$ الامتصاصية

$\epsilon =$ معامل الممتصية المولارية وهو مقدار ثابت لكل مادة ماصة للاشعاع ويقاس بوحدات لترمول-اسم⁻¹ ،
 $C =$ تركيز المحلول مول /لتر

منحنى الامتصاص:- هو منحنى يمثل تغير الامتصاص مع تغير الطول الموجي ومنه يمكن تحديد قيمة λ_{max} . لكل مادة طول موجي تكون عنده الامتصاصية عالية ويدعى بالطول الموجي الاعظم ويرمز له ب λ_{max} وهو صفة مميزة للمادة الماصة للاشعاع.

مخطط يوضح أهم الوحدات الأساسية لمطياف الأشعة فوق البنفسجية – المرئية

أهمية مطيافية UV-Vis :-

(١) بالإمكان تقدير تراكيز تصل الى مولاري 10^{-9} .

(٢) حتى الأصناف التي لا تستجيب للامتصاص يمكن جعلها تستجيب عن طريق تحويلها الى معقدات .

(٣) القدرة على التحكم بالانتقائية من خلال λ_{max} حيث لكل صنف قيمة λ_{max} معينة.

(٤) طريقة سهلة وسريعة ودقيقة.

مثال (١) :- مركب له معامل امتصية مولارية مساويا الى 6.74×10^3 لتر مول^{-١}. سم^{-١} ، ما هو تركيز المركب الذي يعطي $T = 8\%$ اذا كان سمك الخلية = 2.5 سم ؟

$$A = 2 - \log \% T = 2 - \log 8 = 1.097$$

$$A = \epsilon b C$$

$$1.097 = 6.5 \times 10^{-3} \times 2.5 \times C$$

$$C = 6.74 \times 10^3$$

مثال (٢) :- اذا كان تركيز مادة 1.40×10^{-4} مولاري فأحسب الامتصاصية و $T\%$ علما بأن معامل الامتصية المولارية يساوي 1120 . لتر مول^{-١}. سم^{-١} وطول مسار الاشعاع 1.00 cm .

$$A = \epsilon b C = (1120 \text{ L. mol}^{-1} \text{cm}^{-1})(1.00 \text{ cm})(1.40 \times 10^{-4} \text{ M}) = 0.157$$

$$T = 10^{-A} = 10^{-0.157} = 0.697 \text{ or } 69.7\%$$

مثال (٣) :- وجد ان نفاذية محلول تساوي 85.0% عندما تم القياس بخليه سمكها 1.00 سنتيمتر ماهي النسبة المئوية للنفاذيه اذا تم مضاعفه طول مسار الاشعاع الى 10.00 سنتيمتر.

$$A = -\log T = -\log (0.850) = 0.0706$$

زيادة طول مسار الاشعاع بمعامل 10 يسبب زيادة الامتصاصية بمعامل 10 لذا فإن الامتصاصية 0.706 وان النفاذية

$$T=10^{-A} = 10^{-0.706}$$

$$=0.197 \text{ or } 19.7\%$$

مثال ٤ :- اذا كان محلول البرمنكنات يعطي امتصاص 0.5 عند 520 nm وكان محلول البرمنكنات بتركيز $1.0 \times 10^{-4} M$ يعطي امتصاص قدره $A=0.2$ فأحسب التركيز المولاري للمحلول الأول؟

$$\frac{A_1}{A_2} = \frac{C_1}{C_2}$$

$$A_1 \times C_2 = A_2 \times C_1$$

$$0.5 \times 1 \times 10^{-4} = 0.2 \times C_1$$

$$C_1 = 0.00025 M$$

مثال ٥ :- يظهر المركب X امتصاصية مولية مقدارها $2.45 \times 10^3 M^{-1}.cm^{-1}$ عند طول موجي اعظم يساوي 450 nm ، ما تركيز المركب X في محلول الذي يسبب نقصا قدره 25% من قيمة الاشعاع عند نفس الطول الموجي اذا علمت ان المحلول موضوع في خلية قياس طولها 1.0 cm

$$T = \frac{I_t}{I_0}$$

$$T = \frac{75}{100}$$

$$T = 0.75 \times 100 = 75\%$$

$$A = 2 - \log \% T$$

$$A = 2 - \log 75 = 2 - 1.875 = 0.125$$

$$A = \epsilon b C$$

$$0.125 = 2.45 \times 10^3 \times 1.0 \times C$$

$$C = 5.1 \times 10^{-5} \text{ M}$$

تطبيقات قانون بير – لمبرت في التحليل الكمي :-

توجد طريقتان لحساب تركيز مادة معينة باستخدام قانون بير – لمبرت :-

(١) لطريقة المباشرة :- وتتطلب معرفة الامتصاصية المولية للنموذج المراد تركيزه مباشرة (من الجداول) والطول الموجي الأعظم (من الجداول) لمادة معلومة.

٢) منحنى المعايرة القياسي:- Standard curve

حيث يتم تحضير سلسلة من محاليل قياسية ويتم قياس الامتصاصية لكل تركيز فنحصل على خط مستقيم ثم قياس امتصاصية المحلول المجهول ونعمل تسقيط على التركيز . وهو عبارة عن منحنى بياني بين قيم الامتصاصية والتركيز عند الطول الموجي الأعظم λ_{max} ، حيث يحضر سلسلة من محاليل قياسية بتركيز مختلفة ثم تقاس الامتصاصية (A) عند λ_{max} ثم نرسم A مقابل C فنحصل على خط مستقيم يمر بنقطة الأصل ثم نأخذ المحلول المجهول التركيز ونقيس الامتصاصية ثم نقوم بأسقاط قيمة الامتصاصية على التركيز المقابل.